

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 12-5-75038858

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

## ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Téléphone : 86-36-24

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

M. le Sous-Régisseur de recettes  
de la Protection des Végétaux

93, RUE DE CURAMBOURG  
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

C. C. P. : La Source 4604-25

BULLETIN TECHNIQUE N° 54

7 MAI 1975

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

ARBRES FRUITIERS

Les projections d'ascospores continuent.

D'autre part, les premières taches de Tavelure peuvent apparaître maintenant dans les vergers insuffisamment protégés lors de la période pluvieuse du 10 au 17 Avril.

De plus, les pluies de ces derniers jours ont été, en général, suffisantes pour lessiver le dernier traitement.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement, dès que possible.

On considère actuellement que 15 à 20 mm de pluie en une seule fois ou 20 à 25 mm de pluie cumulés nécessitent le renouvellement d'un traitement.

### OIDIUM DU POMMIER

Les manifestations de cette maladie sont parfois fréquentes dans certains vergers. Il est donc conseillé de profiter du traitement dirigé contre la Tavelure pour lutter contre l'Oïdium.

### ARAIGNEES ROUGES-PSYLLES-CHENILLES DEFOLIATRICES-PUCERONS

Les indications données dans notre Bulletin du 28 Avril restent toujours valables.

### MALADIE DU DESSECHEMENT DES JEUNES POUSSES DU FRAMBOISIER (Didymella applanata)

Les projections d'ascospores continuent.

Il est donc nécessaire de renouveler le traitement conseillé dans notre Bulletin du 28 Avril, dans tous les cas où il aura été lessivé par les pluies abondantes de ces derniers jours.

### BLACK-ROT

VIGNES

Les premières projections d'ascospores ont été observées.

Toutes les vignes sont maintenant à un stade où elles peuvent être contaminées.

Il y a donc lieu d'effectuer un premier traitement dès que possible en choisissant un des produits conseillés dans la liste qui est parue dans le numéro de Mars de la revue "PHYTOMA".

Ce traitement est obligatoire sur tous les cépages, y compris les hybrides producteurs directs qui peuvent être également attaqués par cette maladie, dans toutes les communes des départements du Cher, de l'Indre, du Loir et Cher, de l'Indre et Loire et du Loiret qui ont été déclarées contaminées par des arrêtés préfectoraux.

## EXCORIOSE - ROT BRENNER

Les indications données dans notre Bulletin du 21 Avril restent toujours valables.

Dans toutes les régions où l'on redoute ces maladies, il y a lieu d'effectuer un traitement s'il n'a pas été fait, conformément aux conseils donnés.

## ARAIGNEES ROUGES

Les premières éclosions des oeufs d'hiver ont été observées.

Toutefois, les sondages effectués indiquent que ces oeufs d'hiver sont en général peu nombreux. Seules des observations répétées permettront de juger de l'opportunité d'un traitement.

Dans les cas où une intervention serait nécessaire, il est préférable d'utiliser le TETRASUL (Animert) efficace contre les oeufs d'hiver et les larves.

## PYRALE DE LA VIGNE

Ce ravageur semble en extension dans certains vignobles. Il fait des dégâts en dévorant les jeunes feuilles qu'il rassemble au moyen de fils de soie.

Dans les vignes où des attaques ont été observées l'an dernier, il est nécessaire de surveiller périodiquement les cultures afin d'intervenir, dès que les premières chenilles auront été observées, en utilisant une des matières actives suivantes : ACEPHATE (75 g/hl), METHOMYL (62,5 g/hl), MEVINPHOS (50 g/hl).

## VERS DE LA GRAPPE

Les premiers papillons ont été capturés en piège sexuel depuis un certain temps déjà dans la plupart des régions viticoles. Les premières pontes ont été déposées.

Toutefois, il est encore trop tôt pour intervenir. Il est nécessaire d'attendre un prochain Bulletin de la Station d'Avertissements Agricoles.

## GRANDES CULTURES

### PUCERON DE LA BETTERAVE

Les premiers pucerons verts ont été observés dans les parcelles semées très précocement au début du mois d'Avril.

Il est donc conseillé de surveiller les semis précoces afin d'intervenir en utilisant un des produits conseillés dans la liste parue dans le numéro de Mars de la revue "PHYTOMA". Dans les cultures traitées à l'ALDICARBE, aucun traitement n'est nécessaire sur les jeunes plantes, l'efficacité de ce traitement pouvant se prolonger pendant 45 jours.

## CULTURES LEGUMIERES

### POURRITURE GRISE ET MALADIE DES TACHES ROUGES DU FRAISIER

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de ces maladies. Nous rappelons que les méthodes de lutte ont été précisées dans notre Bulletin du 21 Avril.

Les Ingénieurs Chargés des  
Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la Circonscription Phytosanitaire "CENTRE"

G. RIBAUT

G. BENAS

B. LELIEVRE

....